

paroxystique nocturne, en particulier l'aplasie médullaire. Si l'agent délétère pour la population hématopoïétique normale (quel qu'il soit) agit par l'intermédiaire d'une protéine à ancrage GPI, la survenue d'une mutation inhibant la synthèse de l'ancrage dans une cellule souche pluripotente lui permettrait d'échapper au danger encouru par les cellules normales, déterminant ainsi son expansion clonale [10].

E. B.

1. Nicholson-Weller A, March SP, Rosenfeld SI, Austen KF. Affected erythrocytes of patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria are deficient in the complement regulatory protein, decay accelerating factor. *Proc Natl Acad Sci USA* 1983 ; 80 : 5066-70.
2. Holguin MH, Wilcox LA, Bernshaw NJ, Rosse WF, Parker CJ. Relationship between the membrane inhibitor of reactive lysis and the erythrocyte phenotypes of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. *J Clin Invest* 1989 ; 84 : 1387-94.
3. Oni SB, Osunkoya BO, Luzzatto L. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria : evidence for monoclonal origin of abnormal red cells. *Blood* 1970 ; 36 : 145-52.
4. Braun Breton C, Pereira da Silva LH. Modulation de l'activité biologique des protéines de surface chez les protozoaires hémoparasites. *médecine/sciences* 1989 ; 5 : 736-43.
5. Ferguson MAJ, Low MG, Cross GAM. Glycosyl-sn-1,2-dimyristylphosphatidylinositol is covalently linked to *Trypanosoma brucei* variant surface glycoprotein. *J Biol Chem* 1985 ; 260 : 14547-55.
6. Homans SW, Ferguson MAJ, Dwek RA, Rademacher TW, Anand R, Williams AF. Complete structure of the glycosyl phosphatidylinositol membrane anchor of rat brain Thy-1 glycoprotein. *Nature* 1988 ; 333 : 269-72.
7. Hyman R. Cell-surface-antigen mutants of haematopoietic cells. Tools to study differentiation, biosynthesis and function. *Biochem J* 1985 ; 225 : 27-40.
8. Miyata T, Takeda J, Iida Y, Yamada N, Inoue N, Takahashi M, Maeda K, Kitani T, Kinoshita T. The cloning of PIG-A, a component in the early step of GPI-anchor biosynthesis. *Science* 1993 ; 259 : 1318-20.
9. Takeda J, Miyata T, Kawagoe K, Iida Y, Endo Y, Fujita T, Takahashi M, Kitani T, Kinoshita T. Deficiency of the GPI anchor caused by a somatic mutation of the PIG-A gene in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. *Cell* 1993 ; 73 : 703-11.
10. Rotoli B, Luzzatto L. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. *Semin Hematol* 1989 ; 26 : 201-7.

■■■■ Un liposarcome myxoïde avec translocation chromosomique et production d'un facteur de transcription hybride. Très récemment, l'équipe de G. Thomas a rapporté le clonage du gène hybride engendré par la translocation caractéristique du sarcome d'Ewing (*m/s n° 9, vol. 8, p. 994*). Dans ce cas, la translocation t(11;22) entraîne l'apparition d'un gène, d'un transcrite et d'une protéine hybrides associant des séquences correspondant à un facteur de transcription de la famille *ets* et à une protéine se liant à l'ARN, dénommée EWS. Anne Crozat *et al.*, avec une équipe de New York (USA) et Lund (Suède) [1], viennent maintenant de décrire une protéine hybride semblable résultant d'une translocation t(12;16)(q13;p11). Ce réarrangement chromosomique aboutit à la formation d'un gène hybride commandant la synthèse d'une protéine dont la partie aminoterminal appartient à un gène TLS et la partie carboxyterminale au gène CHOP. Le gène CHOP code pour un facteur de transcription possédant un domaine de dimérisation à glissière de leucine (*leucine zipper*), de la même famille que C/EBP, qui est exprimé au cours de la lipogenèse et est induit dans différentes conditions aboutissant à des altérations de l'ADN. La protéine CHOP provoquerait un arrêt des divisions, mis à profit pour réparer les altérations de l'ADN. Elle pourrait également jouer un rôle dans la régulation du cycle cellulaire au cours de la lipogenèse. La séquence TLS présente de nombreuses similitudes avec celle du gène *EWS* réarrangé avec le gène *FLI-1* à la suite de la translocation t(11;22) caractéristique du sarcome d'Ewing. La protéine hybride possède le domaine de liaison à l'ADN de CHOP et le domaine effecteur présomptif de TLS, avec une région riche en glutamine et en glycine. De telles régions riches en glutamine font partie de domaines d'activation transcriptionnelle de certains facteurs de transcription, par exemple Sp1. La stimulation anormale de la prolifération pourrait donc


être le résultat du remplacement du domaine effecteur de CHOP par celui de TLS. Cette protéine hybride pourrait ainsi moduler de façon anormale les gènes cibles normaux de CHOP au cours de la lipogenèse et expliquer la formation du liposarcome myxoïde. [1. Crozat A, *et al. Nature* 1993 ; 363 : 640-4.]

■■■■ Les fonctions non enzymatiques des enzymes. Selon la sagesse populaire des biochimistes, tout est simple : les enzymes sont des catalyseurs biologiques accélérant une réaction chimique particulière. Cependant, deux exemples récents illustrent la possibilité pour des enzymes d'avoir d'autres fonctions. Nous avons très récemment reparlé dans *médecine/sciences* du gène *nm-23*, codant pour l'enzyme nucléoside diphosphate kinase, dont des résultats, encore controversés, indiquent que son hyperexpression dans certaines cellules cancéreuses (mélanomes, cancers du sein) aurait en effet anti-métastatique (*m/s n° 6-7, vol. 9, p. 808*). La NDP kinase est une enzyme permettant la synthèse de nucléotides et dont on comprend mal comment l'hyperexpression pourrait avoir un effet d'inhibition sur l'apparition de métastases. Postel *et al.* (Princeton, NJ, USA) montrent maintenant qu'une protéine pratiquement identique à *nm-23* peut se fixer sur une région régulatrice riche en purines du gène *c-myc*, jouant alors le rôle d'activateur transcriptionnel. La relation entre l'activation transcriptionnelle de l'oncogène *c-myc* et l'inhibition des métastases reste peu évidente, mais on peut imaginer que d'autres gènes pourraient être également contrôlés par le produit du gène *nm-23*. De même, l'identification du produit de ce gène à un possible facteur de transcription explique mieux que son homologue chez la drosophile (gène *awd*) soit un gène de développement dont la mutation entraîne des anomalies des ailes. Tout semblait égale-

ment dit des mécanismes par lesquels l'adénosine désaminase (ADA) intervenait dans la fonction lymphocytaire. Le déficit en ADA entraîne en effet une accumulation de désoxyadénosine et de désoxyadénosine-triphosphate dont l'effet toxique semble lié à une inhibition de l'enzyme ribonucléotide réductase. Les lymphocytes déficients en ADA sont ainsi incapables de proliférer en réponse à une stimulation antigénique, ce qui entraîne un syndrome de déficience immunitaire combinée sévère. Cependant, il n'existe pas toujours de corrélation nette entre la fonction immunitaire et la concentration intralymphocytaire en désoxyadénosine. Kameoka *et al.* (Boston, MA, USA) montrent maintenant que l'ADA peut également s'associer à la molécule d'activation CD26 [2], jouant peut-être ainsi un rôle dans la fonction de cette protéine et, de ce fait, dans la réponse immune. Alternativement, CD26 pourrait contrôler la concentration extracellulaire en ADA, qui agirait ainsi, malgré tout, par son activité enzymatique sur l'adénosine, un important médiateur de fonctions cellulaires agissant par l'intermédiaire de récepteurs membranaires spécifiques couplés aux protéines G.

- [1. Postel EH, *et al.* *Science* 1993 ; 261 : 478-80.]
 [2. Kameoka J, *et al.* *Science* 1993 ; 261 : 466-9.]

■■■ Les effets hypertrophiques de l'angiotensine II sont relayés par une production autocrine d'endothéline-1 dans des cardiomyocytes de rat. L'angiotensine II et l'ET-1, deux peptides possédant des propriétés vasoconstrictrices et mitogènes (*p. 1084 de ce numéro*), induisent tous les deux une hypertrophie cardiaque. Ito *et al.* [1] viennent de démontrer que l'ET-1 intervient dans l'hypertrophie cardiaque provoquée par l'angiotensine II par un mécanisme autocrine et/ou paracrine. L'analyse de l'expression de l'ARN messager codant pour la prépro ET-1 (précur-



seur de l'ET-1) par *Northern blot* et hybridation *in situ*, et de la sécrétion d'ET-1 par dosage radio-immunologique, révèle que l'ET-1 est exprimée et sécrétée majoritairement par les cardiomyocytes de rats nouveau-nés et à un degré moindre par l'ensemble des autres cellules cardiaques. L'angiotensine II et l'ET-1 elle-même stimulent de 3 à 4 fois l'expression de l'ARN messager codant pour la prépro ET-1 dans les cardiomyocytes. Cette stimulation est reproduite par les esters de phorbols, et est bloquée par le H7, un inhibiteur de la protéine kinase C, suggérant que la PKC joue un rôle dans la régulation transcriptionnelle de l'ET-1 par l'angiotensine II et l'ET-1, en agissant probablement au niveau du *TPA responsive element* présent dans la région 5' du gène de l'ET-1. L'implication de l'ET-1 dans l'hypertrophie provoquée par l'angiotensine II est établie à l'aide d'une

part d'un antagoniste des récepteurs de l'ET-1 de type A, le BQ 123 (*p. 1084 de ce numéro*), et d'autre part d'oligonucléotides antisens complémentaires d'une partie de la région codante de la prépro ET-1, qui bloquent tous deux l'incorporation de leucine tritiée stimulée par l'angiotensine II. Les oligonucléotides antisens inhibent également l'expression de l'ARN messager de la prépro ET-1 stimulée par l'angiotensine II alors que le BQ 123 n'a aucun effet sur cette voie. Ces résultats démontrent que les effets hypertrophiques de l'angiotensine II sont relayés par une production autocrine d'ET-1 agissant par l'intermédiaire de son récepteur de type A. Ils constituent un exemple caractéristique des interactions multiples et complexes se produisant entre certains peptides vasoactifs et/ou mitogènes.

- [1. Ito H, *et al.* *J Clin Invest* 1993 ; 92 : 398-403.]

ACCUEIL DE JEUNES ÉQUIPES

L'Institut de Génétique et Microbiologie de l'Université Paris-Sud (Unité de Recherche Associée au CNRS n° 1354) disposera courant 1994 de locaux pour accueillir deux chercheurs confirmés désirant constituer autour d'eux et à court terme deux nouvelles équipes. La vocation de l'IGM est l'utilisation de modèles microbiens eucaryotes et procaryotes pour l'étude de problèmes biologiques fondamentaux. Tout en souhaitant maintenir cette direction générale, l'IGM est ouvert à toute proposition de haute valeur scientifique. Les candidats doivent se manifester le plus tôt possible, surtout s'ils souhaitent poser leur candidature dans le cadre d'un programme ATIPE.

Contacteur Jean-Luc Rossignol, IGM, Bâtiment 400, Université Paris-Sud, 91405 Orsay cedex, France. Tél. : 33.1.69.41.70.14. Télécopie : 33.1.69.41.66.78.